

БУСТЕРНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19

В ПОДДЕРЖКУ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА

Вакцинация сегодня является наиболее эффективным и безопасным способом защиты себя, детей, родителей, друзей и коллег от негативных последствий «встречи» с **коронавирусом**. Но иммунный ответ, сформировавшийся после первичной вакцинации, у каждого человека индивидуален как по силе, так по длительности. **Одинаково для всех одно – этот ответ со временем угасает.**

Наиболее эффективный способ усилить специфическую защиту от коронавируса – **БУСТЕРНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ.**



Очередная доза вакцины окажет стимулирующее действие на иммунную систему, «подстегнет» иммунитет. **Более напряженный иммунитет защитит вас от инфекции, предотвратит риски тяжелого течения, осложнений или летального исхода, что очень важно в условиях появления новых вариантов коронавируса.**

Привиться бустерной дозой вакцины рекомендуется через 6 и более месяцев после первичной вакцинации (или после последней бустерной вакцинации).



Для БУСТЕРНОЙ ВАКЦИНАЦИИ взрослого населения используются вакцины, разрешенные к применению в Беларуси (Спутник Лайт, Гам-Ковид-Вак и другие (по показаниям)).

Чтобы наша иммунная система задействовала все свои защитные механизмы, направленные на сохранение здоровья против коронавируса, после прививки должно пройти 2-3 недели. **Поэтому не стоит ждать подъема заболеваемости – лучше привиться заранее.**

Для прохождения бустерной вакцинации обратитесь в поликлинику по месту жительства!

Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!